



Изменения от 2 февраля 2022 г.

Согласно накопленным данным РКИ, КИ, КН подтверждается положительный эффект от следующих комбинаций и препаратов:

- В связи с широким распространением штамма Омикрон, для ранней терапии рекомендуются препараты гидроксихлорохина (плаквенил, иммард), а препараты, связанные с TMPRSS2 переводятся в статус поддерживающих (бромгексин, амброксол, корень солодки)
- В связи с широким распространением штамма Омикрон рекомендуется (если нет противопоказаний со стороны ЖКТ, т.к. это может привести к кровотечениям) увеличить минимальную дозу НПВС (индометацин до 50 мг, ибупрофен до 400 мг) или использовать slow-release форму индометацина (метиндол ретард 75 мг – 1 или 2 раза в день) под прикрытием фамотидина или ингибиторов протонной помпы
- Для снятия болевого симптома в горле при Омикроне рекомендуется использовать спрей или таблетки Стрепсилс Интенсив на основе Флурбипрофена, Септолете тотал в виде спрея или таблеток с бензидамином + цетилпиридиния хлоридом, таблетки Терафлю Лар Ментол, таблетки Граммидин Нео с анестетиком.
- Рекомендуется увеличить срок приема ацетилцистеина (АЦЦ, Флуимуцил) до 14 дней (уменьшив ежедневную дозировку после 8-го дня с 600 до 200 мг)
- Рекомендуется использовать дозировку ивермектина 0.6 мг/кг, но при наличии раздражающих симптомов, связанных со зрением, предлагаем принимать его либо через день, либо разбив на две дозы каждый день
- В рекомендации к ранней терапии добавляются (опционально, под врачебным контролем) использование антидепрессантов Флувоксамин (Рокона) 50 мг дважды в день или Флуоксетин (Флуоксетин Ланнахер) 20 мг дважды в день на протяжении одной-двух недель (при терапии длительностью выше недели необходима консультация со специалистом).
- Предлагается рассмотреть следующие комбинации ранней терапии (в зависимости от тяжести течения и наличия препаратов):
 1. Ивермектин + Гидроксихлорохин
 2. Ивермектин + Антидепрессанты
 3. Ивермектин
 4. Гидроксихлорохин
 5. Антидепрессанты
 6. Никлозамид
 7. Ивермектин + Никлозамид
 8. Никлозамид + Антидепрессанты
 9. Никлозамид + Гидроксихлорохин
 10. Никлозамид + Ивермектин + Гидроксихлорохин
- Меняется рекомендация с «не совместимо» на «с осторожностью» на совместное использование вместе с Ивермектином следующих антидепрессантов:
 1. Флувоксамин
 2. Флуоксетин
 3. Пароксетин
 4. Эсциталопрам
 5. Дулоксетин